

Sexuelanamnes - lathund

Kontaktersak – varför söker du idag?

Testad förut? När?

Har du haft oskyddat sex? När? (skall ha gått minst 1 v innan klamydiaproov)

Sexuell preferens

"Har du haft sex med män, kvinnor eller både och?"

MSM = män som har sex med män- speciella rekommendationer vad gäller provtagning.

Viktig fråga som kan vara avgörande för hur och vilka prover som ska tas. Ex: MSM – ett urinprov kan vara helt inadekvat, otillräckligt, kanske behöver ta prov från rektum/svalg eller alla tre.

Typ av oskyddat sex?

Extra viktigt i MSM gruppen samt i andra fall där det kanske förekommit **enbart** anal/oralsex eller vid symtom från ändtarmen.

"Har du haft oskyddat anal/oralsex? "Var behöver vi ta prov, från urinröret/slidan, svalget, ändtarmen?"

-oskyddat vaginalsex? Ja/nej

-oskyddat analsex? Ja/nej

-oskyddat oralsex? Ja/nej

Partners- senaste året, fast/tillfälliga?

-Fast sexpartner ? kan vara flick/pojkvän, make/maka och/eller annan person

Fast partner erbjuds alltid behandling för klamydia, gonorré, mycoplasma *efter* provtagning, oavsett provsvar. Aldrig ge partnerbehandling utan provtagning.

-Andra sexuella kontakter? – "förutom din fasta partner, har det förekommit andra partners sista året eller sedan förra gången du testade dig?"

Utlandskontakter- vilket/vilka länder? när?

Preventivmedel?

Läkemedel- nyligen tagit antibiotika? Kan i vissa fall påverka provtagningsresultatet.

Allergi mot läkemedel/antibiotika