

## Terapirekommendation DOAK

Med anledning av patentutgångar för rivaroxaban och dabigatran har Dalarnas Läkemedelskommitté uppdaterat rekommendationer gällande val av DOAK. För ytterligare information om interaktioner, kontraindikationer med mera se [www.fass.se](http://www.fass.se) samt [www.regiondalarna.se/terapirekommendationer](http://www.regiondalarna.se/terapirekommendationer).

### Emboliprofylax förmaksflimmer

Preparat	dabigatran (Pradaxa)	rivaroxaban (Xarelto)	apixaban (Eliquis)
Ca pris/dygn dec 2024*	6-8 kr	16 kr	20 kr
Rekommendation	1:a hand nyinsättning	2:a hand nyinsättning	Behöver inte bytas på redan insatta patienter
Normaldos	150 mg x 2	20 mg x 1	5 mg x 2
Reducerad dos	110 mg x 2 vid ålder $\geq$ 80 år eller samtidig verapamil. Överväg vid 75-80 år, eGFR 30-50 ml/min, gastrit/GERD, ökad blödningsrisk	15 mg x 1 vid eGFR 15-49 ml/min	2,5 mg x 2 vid eGFR 15-29 ml/min alt 2 av följande kriterier: ålder $\geq$ 80 år, kroppsvikt $\leq$ 60 kg, kreatinin $\geq$ 133
Absolut gräns eGFR	>30 ml/min	>15 ml/min (försiktighet vid 15-29 ml/min)	>15 ml/min
Dosdispensering	Nej	Ja	Ja

### Behandling och profylax venös tromboembolism

Preparat	rivaroxaban (Xarelto)	apixaban (Eliquis)
Ca pris/dygn dec 2024*	16 kr	20 kr
Rekommendation	1:a hand nyinsättning	2:a hand
Normaldos	15 mg x2 i tre veckor, därefter 20 mg x1	10 mg x2 i 7 dagar, därefter 5 mg x2
Reducerad dos	Vid eGFR 15-49 ml/min överväg 15 mg x1 efter inledande tre veckor om blödningsrisk föreligger	Behandla om möjligt med 5 mg x2 första 1-2 månaderna. Saknas studier på lågdos.
Tillsvidarebehandling	Vid hög trombosrisk: fortsatt standarddos. Vid lägre trombosrisk: 10 mg x1 efter avslutad behandling med standarddos i minst sex månader	Vid hög trombosrisk: fortsatt standarddos. Vid lägre trombosrisk 2,5 mg x 2 efter avslutad behandling med standarddos i minst sex månader.
Absolut gräns eGFR	>15 ml/min	>15 ml/min
Dosdispensering	Ja	Ja

### Byte mellan DOAK-preparat

- Vid eGFR  $\geq$  50 mL/min kan det nya preparatet ges vid tidpunkten för nästa ordinarie dos
- Vid eGFR < 50 mL/min bör ytterligare 12 h passera innan startdos av det nya preparatet.

\* Pris/dygn baseras på förpackning motsvarande 3 månaders behandling, uppdateras löpande